GASTROSKOPIA – PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie w godzinach dopołudniowych
Dzień przed badaniem, wieczorem lekka kolacja bez mleka i nabiału, płyny można przyjmować do 22:00, rano na czczo – nic nie jeść i nie pić. Nie żuć gumy.

Badanie w godzinach popołudniowych
Rano lekkie śniadanie, bez mleka i nabiału. 8 godzin przed badaniem nic nie jeść i nie pić min 3 h. Nie żuć gumy.

Stale przyjmowane leki w tym **leki na nadciśnienie tętnicze** oraz **leki nasercowe** należy **obowiązkowo zażyć rano** popijając 1-2 łykami wody (nie bezpośrednio przed badaniem).

Osoby przyjmujące **leki rozrzedzające krew**, powinny **konsultować z lekarzem prowadzącym** sposób ewentualnego odstawienia.

Osoby przyjmujące którykolwiek z następujących leków: inhibitorów pompy protonowej (IPP) takich jak lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol, dexlansoprasol, lub H2 blokerów: ranitydyna, famotydyna, o ile lekarz nie zaleci inaczej, powinny przerwać ich stosowanie 2 tygodnie przez wyznaczonym terminem gastroskopii. Po odstawieniu wyżej wymienionych leków – w celu złagodzenia objawów można nadal przyjmować np. alginiany, preparaty zobojętniające lub jedyny preparat zawierający kwas hialuronowy działający w przełyku i chroniący jego śluzówkę przed treścią refluksatu – aż do dnia poprzedzającego badanie.

Należy przynieść ze sobą listę aktualnie przyjmowanych leków oraz informację o wszystkim, co wywołuje u pacjenta uczulenia.

Osoby, które przed badaniem mają otrzymać leki uspokajające, powinny umówić się z kimś, kto odbierze je z pracowni endoskopowej i pozostanie z nimi maksymalnie przez 24 godziny.

W dniu badania należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Każde badanie poprzedzone jest rozmową z lekarzem, podczas której należy poinformować o zażywanych lekach, uczuleniach lub wynikach innych badań. **Jeżeli w przeszłości miała Pani/Pan wykonane jakiekolwiek badania endoskopowe, prosimy o zabranie ich wyników ze sobą.** Pozwoli to na porównanie przebiegu ewentualnych chorób przewodu pokarmowego. Ze względów bezpieczeństwa pacjenta, bezpośrednio przed badaniem należy usunąć wszelkie ruchome protezy zębowe i zdjąć okulary.

Po zakończeniu badania zalecana jest lekkostrawna dieta, po ustąpieniu znieczulenia gardła.